

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»

ВАКЦИНАЦИЯ

в вопросах и ответах

Все о вакцинации в Санкт-Петербурге



ГЦМП

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

covidspb.net

16+

После вакцинации

Что такое этапы вакцинации?

Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I (V1) в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 (+/- 3 дня) день вводят компонент II (V2) в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.

После первой прививки (V1) вам сразу сообщат в какой день и время прийти на введение второго компонента (V2). Позже вам могут перезвонить и попросить придти в другое время или другой день. Как правило, в первую половину дня делают V1, вторую половину V2.

Что делать, если заболел после первого компонента?

В случае заболевания Covid-19 между первым и вторым этапом вакцинирования, последний не проводится. Полноценная повторная вакцинация рекомендуется, согласно инструкции к вакцине, через 6 месяцев после выздоровления.

Если между первой и второй прививкой человек заболел острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При не тяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию можно проводить после нормализации температуры.



Какие возможны индивидуальные реакции на вакцину?

Какие возможны индивидуальные реакции на вакцину?

В большинстве случаев прививка хорошо переносится. Но и при недомогании волноваться не стоит. Это нормальная индивидуальная реакция организма на вакцину и один из признаков формирования иммунитета.

Возможные индивидуальные реакции, которые проходят в течении 1-3 дней:

У 10% пациентов



Рекомендации: уменьшить физическую активность и дать себе отдохнуть. Не перегружаться и не ругать себя за то, что нет сил.

У 5,7% пациентов




Рекомендации:

При температуре тела выше 38°C принять жаропонижающие и обезболивающие препараты (парацетамол или ибупрофен).

Если температура тела выше 39°C и не снижается в течении 4-х часов после приема медикаментов, необходимо вызвать врача.

У 4,7% пациентов



Рекомендации:

Как правило, лечения не требуется. Для уменьшения отека и дискомфорта можно принять антигистаминные препараты.

У 1,5% пациентов



Рекомендации:

Полоскать горло, орошать антисептическими средствами, обильное теплое питье, использование назальных спреев.

Менее, чем у 1%



Что выдают после вакцинации?

После вакцинации выдаётся справка с указанием названия вакцины, даты, серии и дозы. Если есть прививочный сертификат, то данные вписываются в него. На данный момент прививочного паспорта на Гам-Ковид-Вак нет.

Предостережения

В течение 30 мин после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.

